

Весна – период, когда люди отправляются на дачу, за город подышать свежим воздухом, на рыбалку, устраивают пикники.

Но посещение этих мест весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, а это чревато заражением таких опасных болезней, как клещевой энцефалит и боррелиоз.

Как происходит заражение клещами:

Находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека клещи могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области и др.

Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время незаметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходные с клещевым энцефалитом – клещевой бруцеллез..

При укусе клеща необходимо обратиться в травмпункт, где клеща удалят и введут иммуноглобулин по показаниям:

ГАУЗ СО "ГБ № 36 "Травматологическая"
ул. Центральная, 2, тел.: (343) 252-00-12
(круглосуточно) - приемное отделение
ул. Бажова, 124а, тел.: (343) 350-25-82, (343) 350-32-59
(круглосуточно)

ГБУЗ СО "ЦГБ № 2"
ул. Челюскинцев, 3/5, 389-90-71 (круглосуточно)

ГБУЗ СО "ЦГБ № 7"
ул. Вилонова, 33, тел. 341-73-03 (круглосуточно)

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 23"
ул. Старых Большевиков, 9, тел. 389-93-40
(круглосуточно)

ГАУЗ СО "ГКБ № 14"
пер. Суворовский, 5, тел. 380-13-93 (круглосуточно)

ГАУЗ СО "ЦГБ № 20"
ул. Зои Космодемьянской, 42, тел. 258-22-34 (с 8.00 до 20.00)

ГАУЗ СО "ДГП № 13" (детский)
ул. Буторина, 10, тел. 289-88-00 (ежедневно с 8:00 до 20:00)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
детский сад компенсирующего вида № 356

Буклет для родителей «Осторожно, клещи!»

**Этот маленький злодей
Зверя грозного страшней.
На ветвях, в лесу живет.
Не росу, а кровь он пьет.
Настоящий паразит,
И несет энцефалит.
Облик страшен и зловещ!
Берегитесь! Это – клещ!.**

(автор: Надежда Веденяпина)



**Буклет подготовила воспитатель: Крус Ю.А
2025 г.**

Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее обратиться в травмпункт.

Там насекомое удалят и проверят, не опасно ли оно, не является ли разносчиком инфекции.

Если показаться врачу нет возможности, удалите клеща самостоятельно. Извлекать паразита нужно пинцетом или специальными приспособлениями, делая выкручивающие движения и стараясь не повредить брюшко и хоботок. *Помните, если дернуть быстро, велика вероятность, что верхняя половина туловища клеща останется внутри кожи, что чревато воспалением и нагноением.*

После удаления клеща необходимо проверить место контакта: не остался ли там хоботок? Если все чисто, ранку следует промыть водой или спиртом, смазать йодом или зеленкой. Затем тщательно вымыть руки с мылом.

По возможности, пусть даже на следующий день, отвезите клеща в травмпункт, где «агрессора» исследуют на носительство возбудителя.

Клещи считаются одними из наиболее опасных насекомых в нашей полосе. Дело в том, что они являются переносчиками инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти вирусные инфекции поражают спинной и головной мозг. Заболевания протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут приводить к различным осложнениям.

Как удалить присосавшегося клеща в домашних условиях?

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут
2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.
3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов
4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.
5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для лечебной помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как занозу.
6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек. Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.
7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.
8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию.

Каждый год, согласно медицинской статистике, врачи фиксирует не менее 10 тыс. случаев инфицирования, которое влечет за собой тяжелые формы протекания инфекции.

Регулярная вакцинация взрослых и детей, пребывающих в опасных зонах, помогает свести к минимуму риски тяжелых осложнений и инвалидизации.

По какому графику ставят прививку и когда вырабатывается иммунитет против инфекции?

Вакцинация против клещевого энцефалита проходит в несколько этапов. Существует несколько графиков прививок, которые незначительно отличаются сроками введения.

Примерная схема вакцинации:

**1 вакцинация;
спустя 1-3 месяца - 2 вакцинация;
через 12 месяцев - 3 вакцинация;
через три года - ревакцинация, повторяется каждые три года.**

Иммунная защита против клещевого энцефалита появляется примерно спустя две недели после введения второй дозы вакцины, независимо от того, какой именно препарат вводился. Третья прививка необходима, чтобы сформировался стойкий многолетний иммунитет. Ревакцинация позволяет его поддерживать на протяжении длительного времени.

